



Image du jour

Saison 3

Semaine 7 Episode 2



Terrain : patiente de 69 ans.

Antécédents : Diabète de type 2

Histoire de la maladie : Hospitalisation pour diabète déséquilibré. Douleur de l'extrémité distale du 3^{ème} rayon du pied gauche, fièvre et syndrome inflammatoire biologique.

1) Quelle(s) est(sont) la(les) réponse(s) vraie(s) concernant cet examen ?

A ostéolyse du bord médial de P2 du 2^{ème} rayon

B œdème des parties molles en regard de P2-P3 du 3^{ème} rayon

C possible ostéo-arthrite P2-P3 2^{ème} rayon

D probable ostéo-arthrite P2-P3 du 3^{ème} rayon



Terrain : patiente de 69 ans.

Antécédents : Diabète de type 2

Histoire de la maladie : Hospitalisation pour diabète déséquilibré. Douleur de l'extrémité distale du 3^{ème} rayon du pied gauche, fièvre et syndrome inflammatoire biologique.

1) Quelle(s) est(sont) la(les) réponse(s) vraie(s) concernant cet examen ?

A ostéolyse du bord médial de P2 du 2^{ème} rayon

B œdème des parties molles en regard de P2-P3 du 3^{ème} rayon

C possible ostéo-arthrite P2-P3 2^{ème} rayon

D probable ostéo-arthrite P2-P3 du 3^{ème} rayon



Gauche

Aspect opaque des parties molles en regard de l'ostéo-arthrite : épaissement œdémateux réactionnel des parties molles



Hallux : médial

Bord médial de la deuxième phalange (P2) du 2^{ème} rayon : respecté

Pincement diffus de l'interphalangienne distale du 2^{ème} rayon : possible signe d'arthrite étant donné le contexte et les érosions osseuses de P2 du même rayon

Lyse du bord latéral de la deuxième phalange (P2) du 2^{ème} rayon avec lyse de l'os sous-jacent : probable ostéite

Importante lyse de la 2^{ème} phalange et du bord proximal de la 3^{ème} phalange du 3^{ème} rayon + destruction totale de l'interligne articulaire interphalangienne distale : probable ostéo-arthrite (ostéite + arthrite)

Interlignes articulaires respectés (pas de pincement, pas d'érosion)